


ESTENOSIS PILÓRICA

Referencias:

Enciclopedia de Salud del Hospital del Niño
www.childrenscentralcal.org
Biblioteca Nacional de Medicina de E.E.U.U.
Institutos Nacionales de la Salud
www.nlm.nih.gov



Manatí Medical Center
Calle Hernández Carrión, Urb. Atenas
Manatí, Puerto Rico
Programa Educación a Paciente y Familia
abril 2018




La información que se provee en este folleto es solo con fines educativos. Es importante que siempre consulte a su médico sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.

ESTENOSIS PILÓRICA

Es un problema que afecta a bebés de entre 2 y 8 semana de edad y provoca fuertes vómitos que pueden ocasionar deshidratación.

La porción bajo del estómago que se conecta con el intestino delgado se conoce como píloro. En la estenosis pilórica, los músculos de esta parte del estómago se agrandan, ocasionando el estrechamiento de la apertura del píloro evitando que los alimentos se trasladen desde el estómago al intestino.



SÍNTOMAS:

- Vómitos fuertes y explosivos
- Falta de peso
- Falta de energía
- Menos defecaciones
- Constipación
- Deshidratación

PRUEBAS Y EXÁMENES:

- Examen físico
- Ecografía abdominal
- Radiografía de bario - donde revela el estómago hinchado y un píloro estrecho.
- Análisis de sangre - para evaluar la deshidratación.

TRATAMIENTO:

- Cirugía para dilatar el píloro (piloromotomía)
- Se utiliza un dispositivo llamado endoscopio con un globo para dilatar el píloro en caso de que el bebé no se pueda dormir con anestesia.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN LUEGO DE UNA CIRUGÍA:

Frecuentemente, los bebés pueden comenzar a beber pequeñas cantidades de líquidos transparente (electrolitos) durante las primeras 24 horas. Sin embargo, es posible que los bebés continúen vomitando durante varios días después de la intervención debido a la inflamación del área operada de músculo pilórico. Luego la inflamación desaparece a los pocos días.

La mayoría de los bebés comienzan con la alimentación normal cuando llegan a su hogar.

Es importante que siga todas las instrucciones dadas por el médico y aclare todas sus dudas.

